


# SBT-SEMINAR NEUROPSYCHOLOGIE VOM VERHALTEN

THERAPIE BEDEUTET VERÄNDERUNG




SBT IN BERLIN  
STRATEGISCH-BEHAVORALE THERAPIE  
**INSTITUT FÜR  
VERHALTENSTHERAPIE**

# VERLAUF DES WAHRNEHMUNGSPROZESSES





# Psychosoziale Bedingungen, die das aggressive Verhalten fördern



# WAHRNEHMUNGSSTÖRUNG


(Auswirkung auf die kindliche Entwicklung)





Intensität des Reizes: die Reaktion sollte entsprechend der Stärke des Reizes erfolgen.






Therapie reduziert die Intensität der Störung.

Die Steuerung des Therapeuten wird mit fortschreitender Therapie reduziert. Mit fortschreitender Therapie gewinnt der Patient seine/ihre eigene Steuerung.






Frühe Kindheit


Mittlere Kindheit

Adoleszenz



(modifiziert nach Patterson et al., 1989)






Der Verlust von  
Gleichgewicht  
(Egostasis):  
NEUROSE





# VARIATIONEN DES PSYCHISCHEN WESENS



Neurose ➔ lässt sich gut behandeln

Psychose ➔ lässt sich gut behandeln aber mit  
Medikation

Persönlichkeitsstörung ➔ schwieriger zu behandeln

